

Effets indésirables les plus fréquents Prévention et conduite à tenir en cas de :

Hypertension artérielle

Si vous ressentez des maux de tête, des palpitations, des sensations de vertiges ou des bourdonnements d'oreilles, contactez votre médecin traitant.

Prudence en cas de conduite de véhicule.

Diarrhées ⇒ Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.

Limitez votre consommation de lait, de café.

Évitez l'alcool, les boissons gazeuses, les matières grasses, les aliments riches en fibres (légumes verts, céréales, fruits, etc).

Privilégiez les viandes blanches, les poissons maigres, le riz, les féculents, les pommes de terre, les carottes, les bananes...

Si votre médecin vous a prescrit un traitement anti-diarrhéique, prenez-le.

Si votre diarrhée persiste, contactez votre médecin traitant.

Nausées, vomissements, perte d'appétit

Prenez :

- les antiémétiques prescrits par votre médecin,
- des repas légers et fractionnés (5 à 6 repas par jour).

Buvez fréquemment de l'eau fraîche, du cola dégaçifié, par petites gorgées entre les repas.

Évitez les aliments frits, gras, épicés, trop sucrés.

Possible modification du goût

Fatigue ⇒ Respectez une bonne hygiène de vie (alimentation saine, repos, petite marche).

Diminution du nombre de certaines cellules sanguines

Consultez sans attendre votre médecin traitant en cas de fièvre (température supérieure ou égale à 38°C), frissons ou tout autre signe d'infection (toux, mal de gorge, sensation de brûlures urinaires).

Ne prenez pas de paracétamol sans avis médical.

Crampes, douleurs musculaires :

Buvez régulièrement, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.

Troubles cutanés

Sécheresse de la peau : ⇒ utilisez un savon doux sans parfum et une crème hydratante.

Une **dépigmentation de la peau** peut apparaître.

Troubles hépatiques

Évitez les aliments frits, gras, trop sucrés, l'alcool. Prenez des repas légers.

Ce traitement nécessite un suivi biologique. Des analyses vous seront donc prescrites.



Vous présentez des effets indésirables qui vous inquiètent : **contactez votre médecin traitant**, il décidera de la meilleure conduite à tenir.



Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la notice.


Aide mémoire

PAZOPANIB VOTRIENT®

Formes / Présentations / Prix

Comprimés pelliculés dosés à :

- **200 mg** : roses, en forme de gélule portant l'inscription « GS JT » sur une face.



Flacon de 30 comprimés : **749,58€** soit **24,99 € le comprimé.**

- **400 mg** : blancs, en forme de gélule portant l'inscription « GS UHL » sur une face.



Flacon de 30 comprimés : **1 460,86 €**, soit **48,70 € le comprimé.**

Flacon de 60 comprimés : **2 814,28 €**, soit **46,91 € le comprimé.**

Tampon de la pharmacie


Votre posologie est stricte et individuelle, pour l'établir votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos antécédents et de votre tolérance au traitement.

La thérapeutique ciblée orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite un suivi rigoureux.

Consignes générales


 Respectez votre prescription médicale et notez systématiquement chaque oubli sur un carnet.

! Vous ne devez jamais écraser, ni mâcher, ni sucer les comprimés de Pazopanib (VOTRIENT®).
Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

 Si vous avez pris accidentellement trop de comprimés, contactez immédiatement votre oncologue.
N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre oncologue.

 Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise.

 **Conservez votre traitement hors de la portée des enfants.**

 Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés : ne les jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères.

N'ayez jamais recours à l'AUTOMEDICATION (même certains médicaments ou tisanes à base de plantes comme le millepertuis) : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.

 Certains aliments sont contre-indiqués (ex : pamplemousse, réglisse).

➔ Parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin traitant.
Donnez leur la liste complète de vos médicaments, même ceux vendus sans ordonnance.

Quand devez-vous prendre Pazopanib (VOTRIENT®) ?



Tous les jours, **à la même heure, en une prise au moins 1 h avant ou 2 h après un repas, mais toujours de la même façon**, avec un grand verre d'eau.

Comment devez-vous conserver Pazopanib (VOTRIENT®) ?



Dans sa boîte d'origine. Ne pas mettre dans un pilulier.
A l'abri de l'humidité.
A une température ne dépassant pas 25°C.

Exposition au soleil ?



L'exposition au soleil n'est pas recommandée : protégez-vous avec un écran haute protection d'indice 50 et +, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.

Chute des cheveux sous Pazopanib (VOTRIENT®) ?



Pazopanib (VOTRIENT®) peut parfois entraîner leur dépigmentation (= décoloration) ainsi qu'une chute des cheveux.
Cet effet est réversible à l'arrêt du traitement.
Limitez les soins agressifs, type teinture ou permanente.

Votre vie en pratique ?



Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement.
L'allaitement est interdit pendant le traitement.

Pratiquez une **activité physique** : cela contribue à une meilleure qualité de vie corporelle et physiologique.

Si vous partez en **vacances**, **emportez toujours votre ordonnance** ainsi que **votre carte vitale** et faites activer votre dossier pharmaceutique (DP).

