

## Effets indésirables les plus fréquents Prévention et conduite à tenir en cas de :

**Fatigue** ⇒ Respectez une bonne hygiène de vie (alimentation saine, repos, petite marche).

### Troubles cutanés

Modification réversible de la couleur de la peau (jaunâtre).

Sécheresse de la peau : ⇒ utilisez un savon doux sans parfum et une crème hydratante.

Des petites stries noirâtres sous les ongles peuvent apparaître : manifestations bénignes. Picotements, gonflement, rougeur de la paume des mains et de la plante des pieds (syndrome mains-pieds) : ⇒ contactez votre médecin traitant.

Évitez l'exposition au soleil, les vêtements et les chaussures trop serrés. Utilisez un savon doux et une crème hydratante.

Trempez vos mains et vos pieds dans l'eau fraîche puis séchez sans frotter.

**Diarrhées** ⇒ **Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.**

**Limitez** votre consommation de lait, de café.

**Évitez** l'alcool, les boissons gazeuses, les matières grasses, les aliments riches en fibres (légumes verts, céréales, fruits, etc).

**Privilégiez** les viandes blanches, les poissons maigres, le riz, les féculents, les pommes de terre, les carottes, les bananes...

Si votre médecin vous a prescrit un traitement anti-diarrhéique, prenez-le.

Si votre diarrhée persiste, contactez votre médecin traitant.

### Nausées, vomissements, perte d'appétit

**Prenez :**

- les antiémétiques prescrits par votre médecin,
- des repas légers et fractionnés (5 à 6 repas par jour).

**Buvez** de l'eau fraîche, du cola dégazéifié **fréquemment**, par petite gorgée entre les repas.

**Évitez** les aliments frits, gras, épicés, trop sucrés.

### Hypertension artérielle

Si vous ressentez des maux de tête, des palpitations, des sensations de vertiges ou des bourdonnements d'oreilles, contactez votre médecin traitant.

Prudence en cas de conduite de véhicule.

### Possible modification du goût et d'infections au niveau de la bouche (aphtes) :

Demandez conseil à votre pharmacien.

### Ce traitement nécessite un suivi biologique : des analyses vous seront donc prescrites.



Vous présentez des effets indésirables qui vous inquiètent : **contactez votre médecin traitant**, il décidera de la meilleure conduite à tenir.



Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la notice.

## Aide mémoire



### Formes/Présentations/Prix

- **Gélules 12,5 mg** : coiffe et corps couleur orange, inscription « Pfizer et STN 12,5 mg ». **Prix : 1 366 € la boîte, soit 49 € la gélule.**

- **Gélules 25 mg** : coiffe couleur caramel et corps orange, inscription « Pfizer et STN 25 mg ». **Prix : 2 635 € la boîte, soit 95 € la gélule.**

- **Gélules 50 mg** : coiffe et corps couleur caramel, inscription « Pfizer et STN 50 mg ». **Prix : 5 140€ la boîte, soit 184 € la gélule.**

- Présentation en plaquettes thermoformées de 28 gélules.



### Tampon de la pharmacie


**Votre posologie est stricte et individuelle**, pour l'établir votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos antécédents et de votre tolérance au traitement.

**La thérapeutique ciblée orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite un suivi rigoureux.**

## Consignes générales


 Respectez votre prescription médicale et notez systématiquement chaque prise ou oubli sur un carnet.

**!** Vous ne devez jamais ouvrir, mâcher, sucer ni broyer les gélules de Sunitinib (SUTENT®).  
Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

 Si vous avez pris accidentellement trop de gélules, contactez immédiatement votre oncologue.  
N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre oncologue.

 Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise.

 **Conservez votre traitement hors de la portée des enfants.**

 Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées : ne les jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères.

N'ayez jamais recours à **l'AUTOMEDICATION** (même certains médicaments ou tisanes à base de plantes comme le millepertuis) : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.

 Certains aliments sont contre-indiqués (ex : pamplemousse, réglisse).

➔ **Parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin traitant.**  
Donnez leur la liste complète de vos médicaments, même ceux vendus sans ordonnance.

## Quand devez-vous prendre Sunitinib (SUTENT®) ?



Tous les jours, **à la même heure pendant ou en dehors des repas** avec un grand verre d'eau.

## Comment devez-vous conserver Sunitinib (SUTENT®) ?



Dans sa boîte d'origine. Ne pas mettre dans un pilulier.  
A l'abri de l'humidité.  
A une température ne dépassant pas 25°C.

## Exposition au soleil ?



**L'exposition au soleil n'est pas recommandée** : protégez-vous avec un écran haute protection d'indice 50 et +, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.

## Chute des cheveux sous Sunitinib (SUTENT®) ?



Cet effet indésirable est rare mais Sunitinib (SUTENT®) peut parfois entraîner leur dépigmentation (= décoloration). Cet effet est réversible à l'arrêt du traitement.  
Limitez les soins agressifs, type teinture ou permanente.



## Votre vie en pratique ?



Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement.  
L'allaitement est interdit pendant le traitement.

Pratiquez une **activité physique** : cela contribue à une meilleure qualité de vie corporelle et physiologique.

Si vous partez en **vacances**, **emportez** toujours **vos ordonnance** ainsi que **vos carte vitale** et faites activer votre dossier pharmaceutique (DP).

